



FICHA TÉCNICA

Speedfol[®]
EL FOLIAR DE LOS EXPERTOS

AMINO CALMAG SL

Speedfol[®] Amino Calmag SL es una solución líquida concentrada de calcio y magnesio complejados por aminoácidos (AA) de origen vegetal. Su complejo de AA - Ca Mg es una pequeña molécula que pasa fácilmente las barreras de la planta (cutícula pared celular y membrana celular). Además, el origen vegetal de los aminoácidos facilita el reconocimiento, absorción y metabolismo de la planta.

Los AA estimulan la fotosíntesis y el control de la apertura de los estomas. Los AA son precursores y activadores de fitohormonas y sustancias de crecimiento, influyen en la síntesis de las proteínas y sirven como fuente de energía para la planta.

Speedfol[®] Amino Calmag SL es aplicado al cultivo para prevenir y corregir deficiencias de Calcio y Magnesio aumentando la tolerancia al estrés (herbicidas, frío, etc.) y reduciendo la aparición de desórdenes fisiológicos.

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto: Líquido soluble

Densidad: 1300 g/1L

2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Calcio (CaO)	6,7% p/p
Magnesio (MgO)	2,7% p/p
Aminoácidos	33,5% p/p

pH 4,0 - 5,0



3. VENTAJAS

- ✓ Alto Contenido de Aminoácidos.
- ✓ Contiene adyuvantes para prevenir el lavado.
- ✓ Nivel de pH del producto adecuado para aplicación foliar.
- ✓ Reduce el riesgo de scorching.
- ✓ No es fitotóxico entre la dosis recomendada.
- ✓ Soporta necesidad de la planta de calcio y magnesio.

Speedfol[®]
AMINO CALMAG SL

AMINO CALMAG SL

4. CULTIVOS Y DOSIS

Cultivo	Máx ml / 100L agua	L/ ha	¿Cuándo aplicar?
Uva de mesa – Vinífera Pisquera	350	5	Aplicar desde brote de 3 a 5 hojas extendidas, 2 a 3 aplicaciones, separadas 7 días. Aplicar 7 y 14 días antes de la cosecha
Arándanos – Frambuesa – Frutilla.	500	2	Aplicar 1 semana después de brotación o trasplante. Repetir 1 a 2 semanas más tarde. Aplicar 7 y 14 días antes de cosecha.
Ajo – Cebollas	500	2	Aplicar en post trasplante cada dos semanas, hasta que el cultivo este establecido.
Apio – Brócoli – Coliflor – Crucíferas – Lechuga – Pepino – Pimentón – Poroto – Repollo – Sandías – Tomate – Zanahoria – Zapallo.	500	2	Aplicar hasta el establecimiento del cultivo (30 días post emergencia o trasplante). Pueden ser dos aplicaciones de 2 lt/há o 4 aplicaciones de 1 lt/há.
Carozos (Cereza – Ciruela – Durazno – Nectarín)	350	5	Aplicar desde hoja extendidas, 2 a 3 aplicaciones, separadas 7 días. Aplicar 7 y 14 días antes de cosecha.
Cereales (Trigo – Cebada – Avena)	1000	1,5	Aplicar a fin de macolla, ideal 2 aplicaciones, separadas 10 y 15 días. En caso de cereales con stress, aplicar inmediatamente.
Cítricos	350	5	Aplicar desde inicio de brotación, en primavera y/o otoño. Aplicar 7 y 14 días antes de la cosecha.
Paltos	350	5	Aplicar sobre frutos mayores a 1 cm, para evitar caídas. Aplicar sobre tejido no lignificado.
Pomáceas (Manzano – Peral)	350	5	Aplicar desde hoja hojas extendidas, 2 a 3 aplicaciones. Aplicar 7 y 14 días antes de cosecha.
Papas – Remolacha	1350	2	Aplicar 2 a 3 semanas después de emergencia. Repetir 2 semanas más tarde.
Maíz y Maravilla	500	2	Aplicar durante los primeros 28 días después de emergencia. Ideal, 2 aplicaciones separadas 7 ^o 10 días.
Frutales en formación	500	2	Aplicar durante los períodos de crecimiento vegetativo. Repita según sea requerido.
Empastadas	600	1	Aplique 1 a 2 semanas, después del corte o pastoreo, para estimular crecimiento rápido.

Antes de usar este producto, por favor lea sus especificaciones, Hoja de Seguridad y demás literatura relacionada con el producto. El uso y aplicación que haga de nuestros productos, la asistencia técnica e información (verbal, escrita o por medio de evaluaciones de producto), incluyendo cualquier sugerencia de formulación o recomendación, están fuera de nuestro control. Por lo tanto es imperativo que pruebe nuestros productos, la asistencia técnica e información con el fin de determinar si se ajustan al uso o aplicación que pretende darles. El análisis de la aplicación – específica debe al menos incluir una prueba para determinar la adaptabilidad del producto desde un punto de vista tanto técnico, como de salud, seguridad y cuidado del medio ambiente. No es recomendable que el producto se utilice para cualquier propósito sin antes verificar que cumple con leyes, reglamentos y requerimientos de registro. No se garantiza la exactitud de la información acá contenida. A pesar que el producto se entrega en buena fe, se provee al comprador sin representación o garantía expresa o implícita, referente a calidad, estado, utilidad, mercadeo, integridad, idoneidad o adaptabilidad a cualquier uso o propósito en particular, o cualquier otro asunto, y sin recurso contra SQM bajo ninguna circunstancia.

Sin limitar la generalidad de lo expuesto, SQM no se responsabiliza del uso dado al producto y, bajo ninguna circunstancia, será culpable de daños especiales, incidentales o consecuenciales derivados de dicho uso.